

POLT 20%



P O L T
2 0 %



CARATTERISTICHE

Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

Colture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino) e vite:
utilizzare 2,8 – 3,3 kg/ha sciolti in 500 – 700 lt di acqua.

Olivo: utilizzare 3,5 – 4,0 kg/ha sciolti in 500 – 700 lt di acqua.

Fragola e colture ortive incluso il finocchio:
utilizzare 2,5 – 3,5 kg/ha diluiti in 500 – 700 lt di acqua.

Colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco):
utilizzare 2,0 – 4,0 kg/ha diluiti in 400 600 lt di acqua.

NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA

Non miscelare con prodotti organici e in particolare con idrolizzati proteici.
Non miscelare con prodotti a reazione alcalina.

Prima di effettuare miscela con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità.

Le carenze di rame si manifesta con ingiallimenti e formazione di macchie sulle foglie e atrofie dei giovani getti. I sintomi delle carenze di rame compaiono più spesso nei terreni ricchi di sostanza organica e aventi reazione alcalina.

GUARDA ON-LINE



COMPOSIZIONE

| | |
|----------------------------|------|
| Boro (B) solubile in acqua | 0,2% |
| Rame (Cu) totale | 20% |

